

Novartis Animal Health	AGITA <sup>®</sup> 10WG – Scheda tecnica	Ed.1.0
		2010 March 2nd

# AGITA<sup>®</sup> 10WG granuli idrosolubili

**Insetticida per la lotta contro le mosche nelle stalle e nei locali di ricovero degli animali**

Presidio medico chirurgico  
Registrazione Ministero della Salute n. 19544 del 26-11-2009

Stabilimento di produzione:  
Kwidza Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Distribuito da:  
Novartis Animal Health spa  
Largo Umberto Boccioni, 11  
21040 Origgio VA

Servizio tecnico tel. 02-96543114

## **GENERALITA'**

AGITA<sup>®</sup> 10 WG è un insetticida formulato in granuli bagnabili solubili per il controllo delle mosche in tutti i tipi di insediamento zootecnico.

AGITA<sup>®</sup> 10 WG contiene il principio attivo Thiametoxam appartenente alla classe dei neonicotinoidi. La presenza di un eterociclo clorotiazolo ne fa un neonicotinoide di seconda generazione.

AGITA<sup>®</sup> 10 WG agisce prevalentemente dopo assunzione orale da parte delle mosche. Una minima attività è esercitata per contatto tarsale.

L'effetto insetticida è di tipo sia abbattente che residuale.

AGITA<sup>®</sup> 10 WG contiene il feromone sessuale z-9-Tricosene: le mosche sono attratte da questa sostanza e assumono quindi il principio attivo nutrendosi dello zucchero contenuto nella formulazione del prodotto.

Aspetto: solido, granulare  
Colore: beige  
Odore: nessuno

Novartis Animal Health	AGITA <sup>®</sup> 10WG – Scheda tecnica	Ed.1.0
		2010 March 2nd

## SPECIE DI DESTINAZIONE

AGITA<sup>®</sup> 10 WG è indicato per la lotta contro le mosche adulte dotate di apparato buccale di tipo succhiante.

AGITA<sup>®</sup> 10 WG non è adatto al controllo delle mosche dotate di apparato buccale pungitore.

## COMPOSIZIONE

Thiametoxam (principio attivo): 10%

z-9-Tricosene: 0,05%

Coformulanti (tra cui zucchero): q.b. a 100%

## CONFEZIONAMENTO

Barattolo da 250 g

Barattolo da 1 kg

## INDICAZIONI D'USO

AGITA<sup>®</sup> 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e spray/spruzzo. L'efficacia persiste per 6 settimane (42 giorni) quando il prodotto viene applicato secondo le indicazioni di seguito riportate.

Raccomandazioni d'applicazione:

### Applicazione A PENNELLO

250 g	1 kg
Sciogliere in 200 ml d'acqua	Sciogliere in 800 ml d'acqua
<b>Superficie trattabile in m<sup>2</sup></b>	
200-300 m <sup>2</sup> di parete o soffitto	800-1200 m <sup>2</sup> di parete o soffitto
<i>Equivalente a 100 m<sup>2</sup> di pavimento*</i>	<i>Equivalente a 400 m<sup>2</sup> di pavimento*</i>

**\*non applicare AGITA<sup>®</sup> 10 WG sul pavimento**

Novartis Animal Health	AGITA <sup>®</sup> 10WG – Scheda tecnica	Ed.1.0
		2010 March 2nd

Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA<sup>®</sup> 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato fino ad ottenere una soluzione pastosa.

Per 100 m<sup>2</sup> di pavimento applicare almeno 20 macchie (di 10 x 30 cm) là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, le condutture del latte, gli esterni delle mangiatoie ecc.

Quando non è disponibile una superficie delle dimensioni desiderate per applicare il numero sufficiente di pennellature o quando non è accettabile un certo scolorimento delle pareti, si possono utilizzare dei pannelli di cartone, legno o assi ed appenderli al soffitto.

### Applicazione A SPRAY / SPRUZZO

<b>250 g</b>	<b>1 kg</b>
Sciogliere in 2 l d'acqua	Sciogliere in 8 l d'acqua
<b>Superficie trattabile in m<sup>2</sup></b>	
100-150 m <sup>2</sup> di parete o soffitto	400-600 m <sup>2</sup> di parete o soffitto
<i>Equivalente a 50 m<sup>2</sup> di pavimento*</i>	<i>Equivalente a 200 m<sup>2</sup> di pavimento*</i>

### **\*non applicare AGITA<sup>®</sup> 10 WG sul pavimento**

Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA<sup>®</sup> 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato. Applicare mediante spray/spruzzo con comuni nebulizzatori o pompe irroratrici, là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, gli esterni delle mangiatoie ecc.

Applicare su circa 1/3 dei muri/pareti.

Usare la sospensione di AGITA<sup>®</sup> 10 WG il giorno stesso della diluizione, preferibilmente immediatamente dopo la preparazione. Non trattare pareti sporche, molto porose o imbiancate per prevenire la perdita d'efficacia a lungo termine. Non applicare su superfici di metallo o di vetro da cui il prodotto può scivolare via.

Novartis Animal Health	AGITA <sup>®</sup> 10WG – Scheda tecnica	Ed.1.0
		2010 March 2nd

## **SICUREZZA PER L'OPERATORE**

Adottare sempre le misure atte a minimizzare l'esposizione degli operatori al formulato.

## **SICUREZZA PER IL CONSUMATORE E L'AMBIENTE**

Nocivo per le api. Non disperdere la miscela avanzata negli stagni, nei corsi d'acqua o nelle acque di scolo. Svuotare completamente i contenitori, smaltirli in modo sicuro dopo averli perforati.

## **RACCOMANDAZIONI GENERALI**

Allontanare gli animali durante il trattamento. Allontanare alimenti non coperti prima dell'applicazione. Non ingerire, non inalare. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Dopo l'applicazione, lavare le parti del corpo esposte e cambiare gli indumenti. In caso di malessere interrompere immediatamente il lavoro. Consultare un medico se i sintomi non scompaiono (se possibile mostrargli l'etichetta).

## **AVVERTENZE**

Applicare sempre lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Proteggere dalla luce solare diretta, dall'acqua e dalla pioggia.

## **CONSERVAZIONE**

AGITA<sup>®</sup> 10 WG conserva la sua validità per 5 anni in confezione chiusa e correttamente conservata al riparo da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall'acqua.