

# DEVILTOP Pasta

## ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO

Per uso professionale

Autorizzazione Biocida (PT 14 – Rodenticida) n° IT/2015/00290/MRP

### CARATTERISTICHE

**DEVILTOP PASTA** è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente contro topi e ratti con una sola ingestione. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione permettendo il controllo dell'infestazione, senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia.

L'esca rodenticida **DEVILTOP PASTA** è caratterizzata da una miscela di componenti di origine alimentare che risulta essere appetibile per le specie sopra indicate.

**DEVILTOP PASTA** contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini e di animali non bersaglio.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

#### Luogo d'impiego

**DEVILTOP PASTA** può essere utilizzato per derattizzazioni all'interno ed intorno ad edifici civili e rurali (industrie, abitazioni, magazzini, cantine, ripostigli) e nelle stive delle navi.

#### Modalità d'impiego:

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Indossare guanti adatti (EN374) durante l'applicazione del prodotto. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca deve essere inserita in un contenitore appropriato a prova di manomissione, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione da parte di bambini e di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Prima di posizionare i contenitori che includono l'esca, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc.

Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (placebo). Utilizzare una spatola per la pulizia delle esche preparate mediante cartuccia.

**Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.** Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. In ogni caso le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfestazione smaltire le esche residue secondo la normativa vigente. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 5 settimane.


Alla fine del trattamento togliere i contenitori e smaltire le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

# PESTNET

### COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:	
Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetenti ed adescanti (*) q.b	100 g



### DOSI D'IMPIEGO

Infestazioni da ratti ( <i>Rattus norvegicus</i> ):	- 90 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni. - per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni.
Infestazioni da topi ( <i>Mus musculus</i> ):	- 50 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni. - per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni.

#### Presentazione dell'esca:

- Colore: blu

### TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

**NOVITÀ** 2017

Esca da 15 g in cartone con manici.	10,005 kg
-------------------------------------	-----------

PESTNET ITALIA srl - 35026 Conselve (PD) Via terza strada, 12  
tel. 049 950 05 88 - www.pestnet-europe.it

PN.03 TOPICIDA - REV. 01 / Febbraio '17