

Vestal Laboratories



NEW VESTAL PVP 179

DISINFETTANTE PER L'IGINENE VETERINARIA
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. 19953 MINISTERO DELLA SALUTE

NUMBER----- DATE ----- REPLACES NO ----- DATED-----

Il NEW VESTAL PVP 179 è un battericida ad ampio spettro liquido concentrato, a base di iodio, particolarmente indicato per le disinfezioni richieste in ambito veterinario ed agroalimentare, in sostituzione di altri prodotti molto più tossici. Il prodotto è istantaneamente solubile, non si combina con le sostanze presenti nell'ambiente di applicazione, mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche di efficacia e stabilità, e non altera le caratteristiche organolettiche dell'acqua trattata.

MODALITA' D'USO

Igienizzazione delle reti di distribuzione dell'acqua: per gli abbeveratoi negli allevamenti industriali, va utilizzato in ragione di 10-15 grammi per 1.000 litri d'acqua (equivalenti a 0,10-0,15 ppm di iodio libero). Per i primi due o tre giorni di trattamento, il dosaggio potrà essere aumentato a 30-40 grammi per 1.000 litri d'acqua.

Preparazione mangime liquido per suini: usare 50-100 grammi di NEW VESTAL PVP-179 per 1.000 litri d'acqua.

Prevenzione mastiti: preparare una soluzione acquosa al 5% (diluizione 1:20) di NEW VESTAL PVP-179 ed applicare sui capezzoli per immersione oppure a spruzzo.

Pediluvio: preparare una soluzione acquosa di NEW VESTAL PVP-179 allo 0,5%. sostituire la soluzione dopo 5-7 giorni.

Disinfezione di ambienti: per stalle, allevamenti, serre, depositi, sale parto, vasche per itticoltura, ecc., preparare una soluzione acquosa di NEW VESTAL PVP-179 allo 0,1-0,5%.

Disinfezione di attrezzature: Preparare una vasca con soluzione acquosa di NEW VESTAL PVP-179 allo 0,2-0,3%. Mangiatoie ed abbeveratoi preventivamente puliti vanno lasciati in immersione per 10-15 minuti. Sciacquare con acqua.

Sanificazione generale: Preparare una soluzione di 15-20 gr per 100 litri d'acqua e spruzzare sulle superfici sia inerti che animate.

Stabulazione dei mitili: utilizzare una soluzione equivalente a 0,5-1 ppm di iodio libero (50-100 grammi di NEW VESTAL PVP-179 per 1.000 litri d'acqua)

Disinfezione di uova ed avanotti: In itticoltura utilizzare concentrazioni pari a 0,10-0,15 ppm di iodio libero (equivalenti a 10-15 grammi di NEW VESTAL PVP-179 per 1.000 litri d'acqua).

STABILITA' ED EFFICACIA

I dosaggi particolarmente ridotti del NEW VESTAL PVP 179, sono dovuti alle caratteristiche del prodotto di alta solubilità ed eccezionale stabilità. Test effettuati dalla ACEGAS di Trieste hanno confermato che dopo 48 ore dall'additivazione in vaso aperto, era presente una concentrazione di iodio libero pari al 50% del titolo originale. Ciò permette di prevenire lo sviluppo della flora batterica nella rete di distribuzione anche durante le ore notturne di "stanca". Test di laboratorio hanno confermato inoltre che l'utilizzo del PVP 179 anche in presenza di sostanza organica (acidi umici e fulvici presenti nelle acque dei pozzi siti in aree intensamente coltivate) non dà luogo a composti alogenati.

AVVERTENZA

Il prodotto è da considerarsi privo di qualsiasi tossicità per l'ambiente, gli animali e gli operatori. Si raccomanda comunque di interrompere il trattamento nel caso di somministrazione di vaccini attraverso la rete idrica. Il NEW VESTAL PVP 179 è invece compatibile con i complessi vitaminici e correttori di pH.

Vestal Chimica Italiana S.r.L.